

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai



14/03/2016



31/03/2010



26/03/2016



26/03/2016



03/08/2015



26/08/2010



18/05/2015




18/05/2015

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai



Nom commun : Cognassier à fleurs
Famille des Rosacées
Origine : Chine, Japon



Le Cognassier à fleurs est souvent appelé à tort Cognassier du Japon alors que ce dernier terme correspond à une autre espèce, le *Chaenomeles japonica*, un buisson aux fleurs plus rouges, également présent au Jardin.

La floraison a lieu tôt dans la saison, dès mars-avril car le mûrissement des fruits nécessite de nombreux mois.

Les fleurs sont groupées en fascicules. Chacune se compose de cinq sépales, 5 pétales rouges, de 40 à 50 étamines et cinq styles glabres, soudés à leur base. Cette soudure différencie le genre *Chaenomeles* du genre *Cydonia*, les vrais cognassiers.

Le fruit, avec ses pépins, est proche du coing (*Cydonia oblonga*). Comme ce dernier, il est comestible cuit (en lui ajoutant beaucoup de sucre), alors que les fruits du Cognassier du Japon ont un goût désagréable de résine.

Le Cognassier à fleurs est souvent planté isolé, en massif ou en haie, pour sa belle floraison vernale qui lui a donné son nom de splendide (*speciosa* en latin). Son succès se décline en de nombreux cultivars.