

Pseudocydonia sinensis (Thouin) C.K.Schneid.



11/04/2018



20/04/2017



14/04/2019



28/04/2017



03/05/2018



06/12/2018



23/10/2018



21/10/2015




01/08/2017



23/05/2018

Pseudocydonia sinensis (Thouin) C.K.Schneid.




Nom commun : Cognassier de Chine

Famille des Rosacées

Origine : Chine

Le Cognassier de Chine est un arbuste qui apprécie le froid de l'hiver (jusqu'à -20°) suivi de soleil au printemps, ainsi qu'un sol plutôt humide et drainant.

Dans la nature, il présente rarement un seul tronc que l'on obtient par élagage, afin de dégager cette partie ligneuse particulièrement décorative.



La floraison apparaît après les feuilles. En avril, de nombreuses fleurs roses solitaires apparaissent sur les rameaux (5 sépales, 5 pétales, 10 étamines, 5 styles). Odorantes, leur nectar est recherché par les abeilles.

Autant la floraison est brève, autant la fructification est longue. L'espèce étant autofertile, les fleurs se transforment en de gros fruits, jaunes à maturité, qui ont la structure d'une pomme à la chair dure et odorante. Il faudra bien les cuire avant de les déguster.

A un moment, tous les Cognassiers étaient des *Cydonia*. Par la suite, le genre a été divisé en trois. Aux *Cydonia* se sont ajoutés les *Chaenomeles* (Cognassiers du Japon) et les *Pseudocydonia* (Cognassiers de Chine). Ces deux derniers diffèrent entre autres, des vrais coings par leurs feuilles dentées.