

Sechium edule (Jacq.) Sw.



03/08/2013



19/09/2018




Fleurs mâles
07/10/2009



08/10/2018



06/09/2018



Fruit mûr coupé



20/09/2013




24/09/2019



20/09/2013



08/10/2018



17/09/2018

Sechium edule (Jacq.) Sw.




Nom commun : Chayotte, Christophine

Famille des Cucurbitacées

Origine : Mexique et Amérique centrale

La Chayotte est une vivace aux longues tiges grimpantes dont la culture demande un sol ameubli et amendé ainsi qu'un endroit abrité et chaud.



Le mot « chayotte » désigne à la fois la plante et le fruit. Il semble être plus ancien que ses autres nombreux noms vernaculaires (chouchou, mirliton, choko, pimpirela, etc.) et provient de son origine amérindienne.

Fin juin, dès que les jours diminuent, la Chayotte commence à fleurir. Les fleurs unisexuées, se répartissent entre les mâles groupées par quatre ou six et les femelles, le plus souvent solitaires, parfois par deux ou trois.

Chacune montre un calice à 5 lobes, une corolle gamopétale jaune, 5 étamines ou un ovaire infère bien visible, terminé par un stigmate en massue.

Un fruit charnu apparaît 30 jours après la pollinisation de la fleur femelle. Sa forme pyriforme et sa taille varient en fonction des variétés cultivées. Il ne contient qu'une seule graine, adhérente à la chair, qui germera « de l'intérieur ».

La Chayotte est cultivée pour ses fruits mangés crus ou cuits, ses jeunes pousses, ses feuilles, ses tubercules, quand elle en produit.